

C L A S S I S I I.

P L A N T A E M O N O C O T Y L E D O N E S.

S T A M I N A H Y P O G Y N A.

CALIX inferus mono aut polyphyllus aut nullus. Corolla nulla. Stamina hypogyna, seu sub pistillo inferta, s^æpè definita, rariūs indefinita. Germen superum simplex; stylus unicus aut multiplex aut nullus; stigma simplex aut partitum. Semen unicum, nudum tectumve, aut fructus unilocularis mono vel polyspermus. Folia plerumque alterna & vaginantia. Flores interdūm abortu dclines.

OBS. Quæ postea de staminibus apud Dicotyledones hypogynis (Claff. 7. 13.) dicentur, eadem ferè nunc Monocotyledonibus hypogynis tribuenda.

Quadruplex in hâc classe disponitur ordo, singulus naturalis, nempè 1°. Aroidæ à subsequentibus plurimùm discrepantes, nulli tamen alteri classi rectius adjiciendæ, donec innoverit germinatio; 2°. Typhæ floribus aroideo more ferè dispositis, Cyperoideis tamen viciniores, sed diversè germinantes; 3°. Cyperoideæ inter Typhas & Gramineas mediae, his præcipue affines; 4°. Gramineæ demùm floratione & fructu distinguae, ordinem verè naturalem nemine diffitente constituentes. Connettitur classis hinc præcedenti (I) quia Aroidæ Naiadibus quibusdam analogæ, indè sequenti (III) quia parùm difficiunt à Palmis, & Juncis Gramineæ.

O R D O I.

A R O I D E A E , L E S A R O I D E S .

SPADIX simplex multiflorus, spathâ involutus aut nudus. Calix nullus aut simplex. Stamina definita aut

B 4

indefinita, spadici inferta. Germina ex eodem spadice nata, nuda aut cincta calice, nunc staminibus mixta, nunc ab eisdem segregata; styli totidem aut nulli; stigmata totidem. Fructus totidem uniloculares mono aut polyspermi. Corculum in perispermō carnoso centrale. Folia vaginaria alterna, saxis omnia radicalia. Spadix sapè solitarius, insidens summo cauli aut saxis capo radicali. Plantæ rariū caulescentes; quædam sexuum dispositione admodum irregulares.

I. Spadix spathâ involutus.

AMBROSINIA, L. * Spadix complanatus, dissepimenti inflat tubum spathæ convolutæ bipartiens; in loculo posteriori infrâ nudus 2-glandulosus, suprà staminifer antheris sessilibus numerosis; in anteriori suprà nudus, basi monogynus, stylo & stigmata simplici, capsula polyspermâ.

ZOSTERA, L. * **ALGA**, T. * Folium vaginans, spathæ vicem gerens. Spadix linearis planus, alterâ paginâ nudus, alterâ testus suprà antheris pluribus sessilibus, infrâ germinibus paucioribus nudis. Styli 0; stigmata simplicia. Capulæ membranaceæ 1-spermæ.

ARUM, T. L. * **DRACUNCULUS**, T. * **ARISARUM**, T. * *Gouet*; *Serpentaire*. Spatha ventricosa, basi convoluta. Spadix cylindricus apice nudus, subiùs staminifer antheris 4-gonis sessilibus numerosis, infrâ dupli cirrhorum ordine instrutus, basi testus germinibus numerosis nudis. Styli 0; stigmata simplicia villosa. Baccæ globosa 1-spermæ aut rariū polyspermæ. *Folia Ari* T. *sagittata*, Dracunculi T. *mulfida*; spatha utriusque magna patens, Arisari T. *parva connivens*.

CALLA, L. * Spatha plana aut cucullata. Spadix cylindricus testus antheris & germinibus commixtis nudis (*in C. ethiopicâ* basi tantum germinifer). Styli brevissimi; stigmata acuta. Baccæ polyspermæ. *An cirri intermixti*.

DRACONTIUM, L. * Spatha cymbiformis. Spadix cylindricus brevis, floribus testus. Singulis calix 5-partitus coloratus. Stamina 7 antheris 4-angulis. Germen 1; stylus 1; stigma 3-gonum. Baccæ polyspermæ. *Huc forte referenda Quebita*, Aubl. Guyan. t. 327. (*suadente ipso autore*), cui caulis tortuofus, folia alterna, flores minimi non descripti, in spiculam axillarem basi bracteolatam aut spathaceam dispositi.

POTHOS, L. * Spatha globosa. Spadix brevis, incrassatus, floribus testus. Singulis calix 4-partitus. Stamina 4. Germen 2 truncatum; stylus 0; stigma 1. Baccæ 1-sperma,

HOUTTUYNIA, Thunb. * Spatha cordata, folio similis. Spadix oblongus pedunculatus, è spathæ petiolo vaginante erumpens, cinctus involucro seu calice communi 4-phyllo, tectus germinibus. Stamina plurima suprà spadicem germinibus intermixta; circa singulum circiter septena. Capitula 3-gonae... *Herba caule simplici; folia alterna petiolo infra (vaginante?) 2-alato, quasi 2-filiforme. Caracter ex Thunb. Jap., mutato partium quarundam nomine. An Naïadibus affinior?*

I I. Spadix nudus, spathæ destitutus.

ORONTIUM, L. * Spadix cylindraceus, flosculis tectus. Calix 6-partitus persistens. Stamina 6, lacinias calicinis alterna. Germen 1; stylus 0; stigma 2-fidum. Folliculus tenuis 1-spermus, calice tectus, immeritus spadici.

ACORUS, T. L. * Spadix cylindricus flosculis tectus. Calix 6-partitus persistens. Stamina 6, (calici inserta?). Germen 1; stylus 0; stigma punctum promiens. Capitula 3-gona 3-sperma (3-locul. polyisp. ex Linn.). Spadix innascens medio folio ultrâ produtto emulanti spatham planam. Affinior foris Juncis, ex Bern. Jussieo.

Oss. Germinatio præcipuus Aroidearum datura caractères, nondim fatis parefit. Monocotyledones judicantur, à exteris tamen diversis: quod ulterius observandum. Stamina, quamvis dispositione parum regularia, hypogyna dicuntur quia semper affixa sunt spadici simul germinifero, seu quod idem est, germinum receptaculo. An Saururus & congeneres huc referendi; an idem de Pipere quoad habitum sat simili? Quis in Aro cirrorum usus? An ordini affinis Pandanus?
